

Kreon 10 000 j. x 20 kaps



Cena: 19,52 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	20 kaps. (butelka)
Producent	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH

Opis produktu

Działanie:

Lek zawiera pankreatynę wieprzową w postaci minimikrosfer w otoczce dojelitowej, umieszczonych w kapsułce żelatynowej. Po rozpuszczeniu kapsułki, minimikrosfery mieszają się z treścią pokarmową (formuła dawki wielokrotnej), następnie w jelicie cienkim ($\text{pH} > 5,5$) ich otoczka ulega rozpuszczeniu i uwalniają się enzymy o działaniu lipolitycznym, amylolitycznym i proteolitycznym.

Wskazania:

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych często związana, ale nie ograniczająca się do: zwłóknienia torbielowatego (mukowiscydozy), przewlekłego zapalenia trzustki, stanu po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stanu po usunięciu żołądka (gastrektomia), raka trzustki, stanu po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenia przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespołu Shwachmana-Diamonda lub stanu po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego.

Dawkowanie:

Doustnie. Zwłóknienie torbielowate trzustki: początkowo 1000 j. lipazy/kg mc./posiłek u dzieci poniżej 4 lat i 500 j. lipazy/kg mc./posiłek u dzieci powyżej 4 lat; u większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc./dobę lub 4000 j. lipazy/g spożytego tłuszczu; dawkowanie należy dostosować uwzględniając nasilenie choroby, kontrolę biegunek tłuszczowych i utrzymanie dobrego stanu odżywienia. Inne zaburzenia związane z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki: dawka w przypadku głównego posiłku wynosi 25 000-80 000 j. Ph. Eur. lipazy, w przypadku przekąsek między posiłkami połowę indywidualnie wyznaczonej dawki; dawkowanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta w zależności od nasilenia zaburzeń trawienia i zawartości tłuszczu w pożywieniu. Kapsułki należy połykać w całości, w trakcie posiłków lub zaraz po posiłku, popijając płynem. Jeśli połknięcie kapsułki sprawia trudności, można ją otworzyć i dodać minimikrosfery do kwaśnego, miękkiego pokarmu lub płynu (o pH

Pamiętaj o przeczytaniu ulotki informacyjnej. Znajdziesz tam dokładne informacje o sposobie przyjmowania leku, przeciwwskazania, działania niepożądane a także wiele innych szczegółów dotyczących produktu.